

NOWOŚĆ!

Comodoro - najplenniejsza odmiana spośród wszystkich odmian pszenżyta ozimego w Polsce (COBORU 2024)

Bezkonkurencyjne połączenie wysokiej zimotrwałości (5), zdrowotności odmiany, bardzo dobrej odporności na wyleganie i porastanie ziarna gwarantuje pewną uprawę w każdych warunkach glebowo-klimatycznych

Wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby w połączeniu z wczesnością odmiany predysponuje ją do uprawy również na słabszych stanowiskach

Wybitnie wysoka odporność odmiany na kompleks chorób podstawy, pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i choroby kłosa

Podwyższona tolerancja na suszę.

Ziarno duże, o wydłużonym kształcie i wyróżniającej je wysokiej zawartości białka

Wybitna wartość paszowa



Żegluj po rekordowych plonach!




Ważniejsze cechy rolnicze



Odporność na choroby




Doskonałe plony w głównych rejonach uprawy pszenżyta w Polsce



Plonowanie odmiany COMODORO (% wzorca) w poszczególnych rejonach kraju w 2024 (źródło: COBORU). W hektarach podano powierzchnię uprawy pszenżyta w danym rejonie (źródło: ARIMR 2023).

Dobry potencjał plonowania COMODORO



Plonowanie odmiany COMODORO (% wzorca, poziom a1/a2) w porównaniu do odmian wzorcowych w 2023 roku (źródło: COBORU)

| Parametry jakościowe ziarna*    |      |
|---------------------------------|------|
| Masa 1000 ziaren                | 46,5 |
| Wyrównanie ziarna               |      |
| Porastanie ziarna w kłosach     | 6    |
| Gęstość ziarna w stanie zsywnym | 6    |
| Zawartość białka                | 8    |
| Liczba opadania                 | 8    |

| Wygląd ładu w poszczególnych okresach rozwoju |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jesień                                        | Równomierne wschody; ładu wyrzędowany, ciemnozielony, z bardzo dobrym, wyróżniającym wigorem                                                                                                                                                                                             |
| Zima                                          | Pojawiają się fioletowe przebarwienia liści (znacznik morfologiczny lepszej zimotrwałości)                                                                                                                                                                                               |
| Wiosna                                        | Pokrój roślin półstojący; szybko rusza z wegetacją po zimie                                                                                                                                                                                                                              |
| Lato                                          | ładu wyrównany (ciemnozielony); rośliny średniej wysokości, o średnim nalocie woskowym; liście krótkie, dość szerokie, ustawione prawie pionowo; kłosa są średniej długości, zbite o krótkich i delikatnych ościach; przy dojrzwaniu zwracając uwagę wypełnieniem; dorodne i duże ziarno |

\*skala 9-stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

| Miejsce w płodozmianie |            |              |             |
|------------------------|------------|--------------|-------------|
| po rzepaku             | po zbożach | po kukurydzy | po burakach |
| ✓✓                     | ✓✓         | ✓✓           | ✓           |

| Norma wysiewu          |                         |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| siew wczesny do 20.IX. | siew optymalny do 10.X. | siew opóźniony do XII. |
| 200-250 szt./m²        | 250-320 szt./m²         | 320-350 szt./m²        |

| Ważniejsze cechy rolnicze*                           |                  |            |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Wymagania glebowe                                    |                  | przeciętne |
| Tolerancja na zakwaszenie gleby                      |                  | 6,0        |
| Dynamika rozwoju jesiennego                          |                  | 8,0        |
| Siła krzewienia                                      |                  | 6,0        |
| Wczesność (ilość dni od 01.01)                       | kłoszenie        | 140        |
|                                                      | dojrzałość pełna | 200        |
| Zimotrwałość                                         |                  | 5,0        |
| Przeżimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza)      |                  | 8,0        |
| Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu | siew wczesny     | 8,0        |
|                                                      | siew optymalny   | 7,8        |
|                                                      | siew opóźniony   | 8,0        |